



Gebrauchsinformation

Cefadysbasin® SE

Mischung

Zusammensetzung:

10 g (10 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Secale cornutum dil. D4 0,58 g, Espeletia schultzei/Espeletia grandiflora e foliis et floribus sicc. dil. D3 (HAB; V. 4a) 0,58 g, Arnica montana dil. D6 0,58 g, Plumbum metallicum dil. D8 0,58 g, Barium carbonicum dil. D8 0,58 g

Sonstiger Bestandteil: Likörwein

Hinweis: Enthält 25 Vol.-% Alkohol

Darreichungsform und Inhalt: Mischung zum Einnehmen 50 ml und 100 ml

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Gefäßsystems

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG, Ostbahnhofstr. 15, 87437 Kempten
Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Begleittherapie bei peripheren Durchblutungsstörungen.

Hinweis: Bei anhaltendem Schmerz, Blässe, Kälte und Kribbelgefühl in dem betroffenen Arm/Bein ist sofort ein Arzt aufzusuchen, da es sich um einen

plötzlich aufgetretenen Verschluss der zuführenden Blutgefäße handeln kann, der notfallmäßiges Eingreifen erfordert.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Alkoholkranken.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Cefadysbasin® SE bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und auf Grund des Alkoholgehaltes sollte Cefadysbasin® SE in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält 25 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,7 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,2 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

b.w.





Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, erhalten Erwachsene bei akuten Zuständen je 5 bis 10 Tropfen alle halbe bis ganze Stunde, jedoch höchstens 12-mal täglich; bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal täglich je 5 bis 10 Tropfen. Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollten die Tropfen unverdünnt etwa eine Minute im Mund belassen werden. Man kann die Tropfen auch auf einem Stück Zucker oder Brot einnehmen oder mit einem kleinen Schluck Wasser, den man möglichst lange im Mund behält.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Die Dauer der Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt mindestens 3 Monate.

Stand der Information: April 2006

Packungsgrößen: 50 ml, 100 ml

TAD

Cefak KG · Postfach 1360 · D-87403 Kempten