

Gebrauchsinformation

Cefagil®

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Wirkstoff: Turnera diffusa dil. D 7



Cefak KG

Postfach 13 60
D-87403 Kempten

Homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Sexualfunktion

Zusammensetzung: 1 ml (= 1 g) enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Turnera diffusa dil. D 7 1 ml

Isotonisiert mit Natriumchlorid

Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Ampullen zu 1 ml Inhalt. Packungen zu 10 und 50 Stück.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG, Ostbahnhofstr. 15, 87437 Kempten

Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Cefagil® nicht anwenden?

Cefagil® ist bei Kindern nicht anzuwenden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cefagil® in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen parenteral 1 - 2 ml bis zu 3-mal täglich, bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1 - 2 ml pro Tag sc., im. oder iv. injizieren.

Art und Dauer der Anwendung:

Der Ampulleninhalt wird subkutan, intramuskulär oder intravenös injiziert.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Stand der Information: März 2006

Packungsgrößen: Ampullen (1 ml) zu 10 St., 50 St.