



Cefaginkgo

Tabletten

Wirkstoff: Ginkgo biloba dil. D4

Zusammensetzung:

In 1 Tablette ist verarbeitet:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
Ginkgo biloba dil. D4 20 mg

Sonstige Bestandteile:
Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat

Darreichungsform und Inhalt:

Tabletten zum Einnehmen, 100 Stück

Homöopathisches Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG
Ostbahnhofstr. 15, D-87437 Kempten
Telefon: 0831/57401-0
Telefax: 0831/57401-50

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

“Wann dürfen Sie Cefaginkgo, Tabletten, nicht anwenden?”

Cefaginkgo, Tabletten, sind bei Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen nicht anzuwenden.

Hinweise hinsichtlich Schwangerschaft/Stillzeit und Kinder: Siehe unter “Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise”.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

“Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?”

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

“Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?”

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3-mal täglich 1 Tablette einnehmen.

Art und Dauer der Anwendung:

Die Akutdosierung ist nicht länger als einige Tage (max. 1 Woche) anzuwenden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Anwendungsfehler/Überdosierung:

Bei der Einnahme größerer Mengen (z.B. Packungsinhalte) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen. Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt befragt werden.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Durchdrückpackung und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Stand der Information: September 2003

TAA
32.2510