



*Liebe Patientin, lieber Patient!*

*Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was bei der Anwendung dieses Arzneimittels zu beachten ist. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Cefatec® 480 FT

Wirkstoff: Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt

**Zusammensetzung:** 1 Filmtablette enthält:

*Arzneilich wirksamer Bestandteil:*

Trockenextrakt aus

Teufelskrallenwurzel (4,4 - 5,0 : 1) 480 mg

Auszugsmittel: Ethanol 60 % (V/V)

*Sonstige Bestandteile:*

Maisstärke, mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Hypromellose, Macrogol 6000, Talkum, Farbstoff E171.

Hinweis für Diabetiker:

Die mit einer Tagesdosis aufgenommene Menge an Kohlehydraten entspricht 0,05 BE.

**Darreichungsform und Inhalt:**

Filmtabletten zum Einnehmen

20 bzw. 50 bzw. 100 Filmtabletten

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Cefak KG, Ostbahnhofstr. 15, D-87437 Kempten

Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50

**Anwendungsgebiete:**

Zur unterstützenden Therapie bei Verschleißerscheinungen des Bewegungsapparates.

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

**Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie Cefatec® 480 FT nicht anwenden?*

Das Arzneimittel darf bei Überempfindlichkeit gegen Teufelskralle oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sowie bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren nicht eingenommen werden.

*Wann dürfen Sie Cefatec® 480 FT erst anwenden, wenn Sie mit Ihrem Arzt darüber gesprochen haben?*

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Cefatec® 480 FT nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Dies gilt auch, wenn die folgenden Angaben bei Ihnen früher einmal zuträfen.

Bei Gallensteinleiden ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

*Was ist in der Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es sollte deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Für die Anwendung von Cefatec® 480 FT bei Kindern liegt kein Erkenntnismaterial vor. Cefatec® 480 FT sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Cefatec® 480 FT nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cefatec® 480 FT sonst nicht richtig wirken kann.

*Wie viele Filmtabletten Cefatec® 480 FT sollen Sie einnehmen und wie oft?*

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen 2-mal täglich 1 Filmtablette ein.

*Wie und wann sollen Sie Cefatec® 480 FT einnehmen?*

Die Filmtabletten sollen morgens und abends zu den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit eingenommen werden.

*Wie lange sollen Sie Cefatec® 480 FT einnehmen?*

Cefatec® 480 FT soll bis zum Eintritt der Beschwerdefreiheit eingenommen werden. Bitte beachten Sie jedoch die Angaben unter "Anwendungsgebiete".

#### **Anwendungsfehler und Überdosierung:**

*Was kann passieren, wenn Cefatec® 480 FT in größeren Mengen angewendet wurde (beabsichtigt oder versehentlich)?*

Für die Originalpackung mit 100 Filmtabletten gilt: Bei gleichzeitiger Einnahme aller Tabletten kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

#### **Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cefatec® 480 FT auftreten?*

In seltenen Fällen sind Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerzen beobachtet worden. Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen [Hautausschläge, Nesselsucht, Gesichtsoedeme bis hin zum Kreislaufzusammenbruch (anaphylaktischer Schock)] beschrieben worden. Sehr

selten wurde bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus ein Blutzuckeranstieg beobachtet, der nach Absetzen zurückging.

Wenn Sie weitere Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

#### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

*Bis wann darf Cefatec® 480 FT verwendet werden?*  
Das Verfalldatum ist auf der Durchdrückpackung und der Faltschachtel aufgedruckt. Nach diesem Datum soll das Arzneimittel nicht mehr verwendet werden.

Nicht über 25° C aufbewahren!

**Stand der Information:** Mai 2007

---

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

TAE  
08/02/24/KB-02 812435

