



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Cefavora® G

Tabletten

Wirkstoff: Ginkgo biloba Ø

### Zusammensetzung:

In 1 Tablette ist verarbeitet:

*Arzneilich wirksamer Bestandteil:*

Ginkgo biloba Ø 20 mg

*Sonstige Bestandteile:*

Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat

### Darreichungsform und Inhalt:

Tabletten zum Einnehmen, 100 Stück

Homöopathisches Arzneimittel

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15, D-87437 Kempten

Telefon: 0831/57401-0

Telefax: 0831/57401-50

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kopfschmerz, Schreibrämpfe, Mandelentzündung.

*Was sollten Sie bei einer Selbstbehandlung beachten?*

Zur Anwendung bei Kopfschmerzen:

Wenn die Kopfschmerzen länger andauern, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.

Zur Anwendung bei Mandelentzündung:

Bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39° C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie Cefavora® G nicht anwenden?*

Keine Einnahme bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Ginkgo biloba.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cefavora® G in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

*Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?*

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Warnhinweise:**

Keine bekannt.

### **Dosierungsanleitung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Cefavora® G nicht anders verordnet hat.

*Wie viel und wie oft sollten Sie Cefavora® G anwenden?*

Erwachsene sollten bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, 1 Tablette einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3-mal täglich 1 Tablette einnehmen.

### **Art und Dauer der Anwendung:**

*Wie sollten Sie Cefavora® G anwenden?*

Cefavora® G Tabletten werden eingenommen. Sie können gekaut oder mit Flüssigkeit, z. B. Wasser, geschluckt werden.

*Wie lange sollten Sie Cefavora® G anwenden?*

Die Akutdosierung ist nicht länger als einige Tage (maximal 1 Woche) anzuwenden. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Anwendungsfehler/Überdosierung:**

*Was ist zu tun, wenn Cefavora® G in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?*

Bei der Einnahme größerer Mengen (z.B. Packungsinhalte) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

### **Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cefavora® G auftreten?*

Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen. Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Durchdrückpackung und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

**Stand der Information:** März 2008

TAA  
32.2511