



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Cefavora® G

Mischung

Wirkstoff: Ginkgo biloba Ø

Zusammensetzung:

10 g Mischung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Ginkgo biloba Ø 4 g

Sonstiger Bestandteil: Likörwein

Hinweis: Enthält 35 Vol.-% Alkohol

Darreichungsform und Inhalt:

Mischung zum Einnehmen, 50 ml

Homöopathisches Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15, D-87437 Kempten

Telefon: 0831/57401-0

Telefax: 0831/57401-50

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Kopfschmerz, Schreibkrämpfe, Mandelentzündung.

Was sollten Sie bei einer Selbstbehandlung beachten?

Zur Anwendung bei Kopfschmerzen:

Wenn die Kopfschmerzen länger andauern, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.

Zur Anwendung bei Mandelentzündung:

Bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39° C ansteigt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Cefavora® G nicht anwenden?

Keine Einnahme bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Ginkgo biloba.

Wegen des Alkoholgehaltes soll das Arzneimittel bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cefavora® G in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allge-

mein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 35 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Cefavora® G nicht anders verordnet hat.

Wie viel und wie oft sollten Sie Cefavora® G anwenden?

Erwachsene sollten bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, 5 - 10 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3-mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen.

Art und Dauer der Anwendung:

Wie sollten Sie Cefavora® G anwenden?

Cefavora® G kann unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit, z. B. Wasser, verdünnt eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Cefavora® G anwenden?

Die Akutdosierung ist nicht länger als einige Tage (maximal 1 Woche) anzuwenden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cefavora® G auftreten?

Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Die Dauer der Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt mindestens 3 Monate.

Stand der Information: April 2008